

绝密★启用前

2018 年普通高等学校招生全国统一考试



广东省理科数学模拟试卷(一)

注意事项:

1. 答题前, 考生务必用 0.5 毫米黑色字迹签字笔将自己所在的县(市、区)、学校以及自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡和试卷的指定位置, 并用 2B 铅笔在答题卡的“考生号”处填涂考生号.
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号. 回答非选择题时, 将答案写在答题卡上, 写在本试卷上无效.
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题:本大题共 12 小题, 每小题 5 分, 共 60 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

- B1. 已知集合 $A = \{x | -1 < 1-x < 1\}$, $B = \{x | x^2 < 1\}$, 则 $A \cap B =$
- A. $\{x | -1 < x < 1\}$ B. $\{x | 0 < x < 1\}$ C. $\{x | x < 1\}$ D. $\{x | 0 < x < 2\}$
- C2. 设复数 $z = a + 4i$ ($a \in \mathbb{R}$), 且 $(2-i)z$ 为纯虚数, 则 $a =$
- A. -1 B. 1 C. 2 D. -2
- A3. 右图为射击使用的靶子, 靶中最小的圆的半径为 1, 靶中各圆的半径依次加 1, 在靶中随机取一点, 则此点取自黑色部分(7 环到 9 环)的概率是
- A. $\frac{3}{20}$ B. $\frac{3\pi}{25}$ C. $\frac{3}{25}$ D. $\frac{\pi}{20}$
- C4. 已知函数 $f(x)$ 满足 $f\left(\frac{x}{2}\right) = x^3 - 3x$, 则函数 $f(x)$ 的图象在 $x=1$ 处的切线斜率为
- A. 0 B. 9 C. 18 D. 27
- B5. 已知 F 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一个焦点, 点 F 到 C 的一条渐近线的距离为 $2a$, 则双曲线 C 的离心率为
- A. $2\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. 2
- D6. $\left(x + \frac{1}{x}\right)(1+2x)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为
- A. 120 B. 160 C. 100 D. 80
- C7. 如图, 网格纸上的小正方形的边长为 1, 粗线画出的是某几何体的三视图, 则该几何体的表面积为
- A. $48 + 8\pi$ B. $96 + 8\pi$ C. $96 + 16\pi$ D. $48 + 16\pi$




C8. 已知曲线 $C: y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$, 则下列结论正确的是

- A. 把 C 向左平移 $\frac{5\pi}{12}$ 个单位长度, 得到的曲线关于原点对称
- B. 把 C 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度, 得到的曲线关于 y 轴对称
- C. 把 C 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到的曲线关于原点对称
- D. 把 C 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度, 得到的曲线关于 y 轴对称

B9. 大衍数列, 来源于《乾坤谱》中对易传“大衍之数五十”的推论. 主要用于解释中国传统文化中的太极衍生原理. 数列中的每一项, 都代表太极衍生过程中, 曾经经历过的两仪数量总和, 是中华传统文化中隐藏着的世界数学史上第一道数列题. 其规律是: 偶数项是序号平方再除以 2, 奇数项是序号平方减 1 再除以 2, 其前 10 项依次是 0, 2, 4, 8, 12, 18, 24, 32, 40, 50, …, 如图所示的程序框图是为了得到大衍数列的前 100 项而设计的, 那么在两个“ \diamond ”中, 可以先后填入

- A. n 是偶数, $n \geq 100$
- B. n 是奇数, $n \geq 100$
- C. n 是偶数, $n > 100$
- D. n 是奇数, $n > 100$



A10. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 若 $A = \frac{\pi}{3}$, 且 $2b\sin B + 2c\sin C = bc + \sqrt{3}a$, 则 $\triangle ABC$ 的面积的最大值为

- A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$
- B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
- D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

A11. 已知抛物线 $C: y^2 = x$, M 为 x 轴负半轴上的动点, MA, MB 为抛物线的切线, A, B 分别为切点, 则 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}$ 的最小值为

- A. $-\frac{1}{16}$
- B. $-\frac{1}{8}$
- C. $-\frac{1}{4}$
- D. $-\frac{1}{2}$

C12. 设函数 $f(x) = \begin{cases} |2^{x+1} - 2|, & x \leq 2 \\ x^2 - 11x + 30, & x > 2 \end{cases}$, 若互不相等的实数 a, b, c, d 满足 $f(a) = f(b) = f(c) = f(d)$, 则 $2^a + 2^b + 2^c + 2^d$ 的取值范围是

- A. $(64\sqrt{2} + 2, 146)$
- B. $(98, 146)$
- C. $(64\sqrt{2} + 2, 266)$
- D. $(98, 266)$

二、填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 把答案填在答题卡中的横线上.


13. 已知单位向量 e_1, e_2 的夹角为 30° , 则 $|e_1 - \sqrt{3}e_2| = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \leq 6, \\ 4x + 5y \leq 6, \\ 5x + 4y \geq 3, \end{cases}$, 则 $z = x + y$ 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

15. 已知 $\sin 10^\circ + m \cos 10^\circ = 2 \cos 140^\circ$, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$.



16. 如图,圆形纸片的圆心为 O ,半径为 6 cm,该纸片上的正方形 $ABCD$ 的中心为 O . E,F,G,H 为圆 O 上的点, $\triangle ABE,\triangle BCF,\triangle CDG,\triangle ADH$ 分别是以 AB,BC,CD,DA 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以 AB,BC,CD,DA 为折痕折起 $\triangle ABE,\triangle BCF,\triangle CDG,\triangle ADH$,使得 E,F,G,H 重合,得到一个四棱锥.当该四棱锥的侧面积是底面积的 2 倍时,该四棱锥的外接球的体积为 Δ .



三、解答题:共 70 分.解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤.第 17~21 题为必考题,每道试题考生都必须作答.第 22、23 题为选考题,考生根据要求作答.

(一)必考题:共 60 分.

17. (12 分)

已知公差不为零的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=5$,且 a_3,a_6,a_{11} 成等比数列.

(1)求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2)设 $b_n=a_n \cdot 3^{n-1}$,求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

18. (12 分)

“微信运动”是一个类似计步数据库的公众帐号.用户只需以运动手环或手机协处理器的运动数据为介,然后关注该公众号,就能看见自己与好友每日行走的步数,并在同一排行榜上得以体现.现随机选取朋友圈中的 50 人,记录了他们某一天的走路步数,并将数据整理如下:

步数/步	0~3000	3001~6000	6001~8000	8001~10 000	10 000 以上
男性人数/人	1	2	7	15	5
女性人数/人	0	3	7	9	1

规定:人一天行走的步数超过 8000 步时被系统评定为“积极性”,否则为“懈怠性”.

(1)以这 50 人这一天行走的步数的频率代替 1 人一天行走的步数发生的概率,记 X 表示随机抽取 3 人中被系统评为“积极性”的人数,求 $P(X \leq 2)$ 和 X 的数学期望.

(2)为调查评定系统的合理性,拟从这 50 人中先抽取 10 人(男性 6 人,女性 4 人).其中男性中被系统评定为“积极性”的有 4 人,“懈怠性”的有 2 人,从中任意选取 3 人,记选到“积极性”的人数为 x ;

其中女性中被系统评定为“积极性”和“懈怠性”的各有 2 人,从中任意选取 2 人,记选到“积极性”的人数为 y ;



求 $x > y$ 的概率.

19. (12 分)

如图,在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB \perp BC$,且 $BC=2AD=4$, E,F 分别为线段 AB,DC 的中点,沿 EF 把 $AEDF$ 折起,使 $AE \perp CF$,得到如下的立体图形.

(1)证明:平面 $AEFD \perp$ 平面 $EBCF$;

(2)若 $BD \perp EC$,求二面角 $F-BD-C$ 的余弦值.



20. (12 分)

$$\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$a^2 = b^2 e^2$$

$$4=3+1$$

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 C 过点 $(1, \frac{\sqrt{3}}{2})$.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若直线 l 与椭圆 C 交于 P, Q 两点(点 P, Q 均在第一象限), l 与 x 轴, y 轴分别交于 M, N 两点, 且满足 $\frac{S_{\triangle PMO}^2 + S_{\triangle QMO}^2}{S_{\triangle PMO} \cdot S_{\triangle QMO}} = \frac{S_{\triangle PNO}^2 + S_{\triangle QNO}^2}{S_{\triangle PNO} \cdot S_{\triangle QNO}}$ (其中 O 为坐标原点). 证明: 直线 l 的斜率为定值.

$$\begin{aligned} f'(x) &= [(x-2)e^x + a(\ln x - x + 1)] \\ &= [(1-2)+\cancel{2x}] \cdot e^x + \left(\frac{1}{x} - x + 1\right) + l \end{aligned}$$

21. (12 分)

已知函数 $f(x) = (x-2)e^x + a(\ln x - x + 1)$.(1) 讨论 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 零点的个数;(2) 若函数 $f(x)$ 的最小值为 $-e$, 求 a 的取值范围.

(二) 选考题: 共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. [选修 4-4: 坐标系与参数方程] (10 分)

在直角坐标系 xOy 中, 圆 $C_1: (x-2)^2 + (y-4)^2 = 20$, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, $C_2: \theta = \frac{\pi}{3} (\rho \in \mathbb{R})$.

(1) 求 C_1 的极坐标方程和 C_2 的平面直角坐标系方程;

(2) 若直线 C_3 的极坐标方程为 $\theta = \frac{\pi}{6} (\rho \in \mathbb{R})$, 设 C_2 与 C_1 的交点为 O, M, C_3 与 C_1 的交点为 O, N , 求 $\triangle OMN$ 的面积.

$$\begin{aligned} C_2: \rho \cos \frac{\pi}{3} \\ \rho^2 = x^2 + y^2 \end{aligned}$$

23. [选修 4-5: 不等式选讲] (10 分)

已知函数 $f(x) = 3|x-a| + |3x+1|$, $g(x) = |4x-1| - |x+2|$.(1) 求不等式 $g(x) < 6$ 的解集;(2) 若存在 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, 使得 $f(x_1)$ 和 $g(x_2)$ 互为相反数, 求 a 的取值范围.

$$\begin{aligned} \rho^2 = x^2 + y^2 \\ \rho^2 = \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

