


选择题 (本大题共12小题, 每小题5分, 共60分)

1. 已知集合  $A = \{x | x(x+1) > 0\}$ ,  $B = \{x | y = \sqrt{x-1}\}$ , 则  $A \cap B = ( )$ .

- A.  $\{x | x > 0\}$  B.  $\{x | x \geq 1\}$  C.  $\{x | 0 < x \leq 1\}$  D.  $\mathbf{R}$

2. 在如图所示的“勾股圆方图”中, 四个相同的直角三角形与中间小正方形拼成一个边长为2的大正方形, 若直角三角形中较小的锐角  $\alpha = \frac{\pi}{6}$ , 现在向该大正方形区域内随机地投掷一枚飞镖, 则飞镖落在小正方形内的概率是 ( ).




- A.  $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$  B.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$  C.  $\frac{4 - \sqrt{3}}{4}$  D.  $\frac{\sqrt{3}}{4}$

3. 已知  $\bar{z}$  是  $z$  的共轭复数, 且  $|z| - \bar{z} = 3 + 4i$ , 则  $z$  的虚部是 ( ).

- A.  $\frac{7}{6}$  B.  $-\frac{7}{6}$  C. 4 D. -4

4. 阅读右边的程序框图, 输出结果  $S$  的值为 ( ).




- A. -1 B. 1 C. -2018 D. 0

5. 在  $\triangle ABC$  中,  $A = \frac{\pi}{3}$ ,  $AB = 2$ ,  $AC = 3$ ,  $\overrightarrow{CM} = 2\overrightarrow{MB}$ , 则  $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC} = ( )$ .

- A.  $-\frac{11}{3}$  B.  $-\frac{4}{3}$  C.  $\frac{4}{3}$  D.  $\frac{11}{3}$

6. 如图，网格纸上小正方形的边长为1，粗线画出的是某几何体的三视图，则该几何体的各个面的面积中，最小的值为（ ）.



- A.  $2\sqrt{5}$       B. 8      C.  $4\sqrt{5}$       D.  $8\sqrt{2}$

7. 已知实数  $a > 0$ ,  $b > 0$ , 则 “ $ab > 1$ ” 是 “ $a + b > 2$ ” 的 ( ).

- A. 充分不必要条件      B. 必要不充分条件  
C. 充要条件      D. 既不充分也不必要条件

8.  $\triangle ABC$  中,  $\angle B = \frac{2\pi}{3}$ ,  $A, B$  是双曲线  $E$  的左、右焦点, 点  $C$  在  $E$  上, 且  $AB = BC$ , 则  $E$  的离心率为 ( ).

- A.  $\sqrt{5} - 1$       B.  $\sqrt{3} + 1$       C.  $\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$       D.  $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

9. 在  $\triangle ABC$  中, 角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ , 且  $2c \cos B = 2a + b$ , 若  $\triangle ABC$  的面积  $S = \frac{\sqrt{3}}{12}c$ , 则  $ab$  的最小值为 ( ).

- A.  $\frac{1}{2}$       B.  $\frac{1}{3}$       C.  $\frac{1}{6}$       D. 3

10. 现某小型服装厂锁边车间有锁边工10名, 杂工15名, 有7台电脑机, 每台电脑机每天可给12件衣服锁边; 有5台普通机, 每台普通机每天可给10件衣服锁边. 如果一天至少有100件衣服需要锁边, 用电脑机每台需配锁边工1名, 杂工2名, 用普通机每台需要配锁边工1名, 杂工1名. 用电脑机给一件衣服锁边可获利8元, 用普通机给一件衣服锁边可获利6元, 则该服装厂锁边车间一天最多可获利 ( ) 元.

- A. 760      B. 780      C. 800      D. 820

11. 函数  $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ , ( $A > 0, \omega > 0$ ), 若  $f(x)$  在区间  $[0, \frac{\pi}{2}]$  是单调函数, 且  $f(-\pi) = f(0) = -f(\frac{\pi}{2})$ , 则  $\omega$  的值为 ( ).

- A.  $\frac{1}{2}$       B. 1      C. 2或 $\frac{1}{3}$       D.  $\frac{2}{3}$ 或2

12. 已知函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 且当  $x > 0$  时,  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{e^x}$ , 则对任意  $m \in \mathbf{R}$ , 函数  $f(f(x)) - m = 0$  的根的个数至多为 ( ).

- A. 3      B. 4      C. 6      D. 9

填空题 (本大题共4小题, 每小题5分, 共20分)

13. 已知函数  $f(x) = 2^x - 2^{-x}$ , 则不等式  $f(2x+1) + f(1) \geq 0$  的解集是 \_\_\_\_\_.



14. 已知6名嫌疑犯  $A, B, C, D, E, F$  中有1人在商场偷走钱包.

路人甲猜测:  $D$  或  $E$  偷的;

路人乙猜测:  $C$  不可能偷;

路人丙猜测:  $A, B, F$  当中必有1人偷;

路人丁猜测:  $D, E, F$  都不可能偷;

若甲、乙、丙、丁中只有1人猜对, 则此人是 \_\_\_\_\_.

15. 若  $(ax+1)\left(2x-\frac{1}{x}\right)^5$  展开式中的常数项为  $-40$ , 则  $a =$  \_\_\_\_\_.

16. 在三棱锥  $S-ABC$  中,  $\triangle ABC$  是边长为3的等边三角形,  $SA = \sqrt{3}$ ,  $SB = 2\sqrt{3}$ , 二面角  $S-AB-C$  的大小为  $120^\circ$ , 则此三棱锥的外接球的表面积为 \_\_\_\_\_.


### 解答题 (本大题共5小题, 共60分)

17. 已知数列  $\{a_n\}$  的各项均为正数, 且  $a_n^2 - 2na_n - (2n+1) = 0$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .

(1) 求  $a_n$ .

(2) 若  $b_n = (-1)^{n-1}a_n$ , 求数列  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和  $T_n$ .

18. 如图, 在四棱锥  $P-ABCD$  中, 底面  $ABCD$  是正方形,  $AD = PD = 2$ ,  $PA = 2\sqrt{2}$ ,  $\angle PDC = 120^\circ$ , 点  $E$  为线段  $PC$  的中点, 点  $F$  在线段  $AB$  上.



(1) 若  $AF = \frac{1}{2}$ , 求证:  $CD \perp EF$ .

(2) 设平面  $DEF$  与平面  $DPA$  所成二面角的平面角为  $\theta$ , 试确定点  $F$  的位置, 使得  $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{4}$ .

19. 中国职业男篮  $CBA$  总决赛采用七场四胜制, 即若有一队先胜四场, 则此队为总冠军, 比赛就此结束. 现甲、乙两支球队进行总决赛, 因两队实力相当, 每场比赛两队获胜的可能性均为  $\frac{1}{2}$ . 据以往资料统计, 第一场比赛可获得门票收入400万元, 以后每场比赛门票收入比上一场增加100万元.

(1) 求总决赛中获得门票总收入恰好为3000万元的概率.

(2) 设总决赛中获得门票总收入为  $X$ , 求  $X$  的数学期望  $E(X)$ .

20. 已知  $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ ,  $F_2(\sqrt{3}, 0)$  是椭圆  $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$  的焦点, 点  $P\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  是椭圆  $E$  上一点.

- (1) 求椭圆  $E$  的方程.
- (2) 过点  $F_1$  的直线  $l$  交椭圆于  $M, N$  两点, 求  $\triangle F_2MN$  面积取得最大值时, 直线  $l$  的方程.

21. 已知函数  $f(x) = (ax^2 + x + a)e^{-x} (a \in \mathbf{R})$ .

- (1) 若  $a \geq 0$ , 函数  $f(x)$  的极大值为  $\frac{3}{e}$ , 求实数  $a$  的值.
- (2) 若对任意的  $a \leq 0$ ,  $f(x) \leq b \ln(x+1)$  在  $x \in [0, +\infty)$  上恒成立, 求实数  $b$  的取值范围.

**选做题(本大题共2小题, 选做1题, 共10分)**

22. 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 曲线  $C$  的参数方程为  $\begin{cases} x = a + a \cos \beta \\ y = a \sin \beta \end{cases}$  ( $\beta$  为参数, 且  $a > 0$ ),

以  $O$  为极点,  $x$  轴的正半轴为极轴, 建立极坐标系, 直线  $l$  的极坐标方程为  $\rho \cos\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{2}$ .

- (1) 若曲线  $C$  与  $l$  只有一个公共点, 求  $a$  的值.
- (2)  $A, B$  为曲线  $C$  上的两点, 且  $\angle AOB = \frac{\pi}{3}$ , 求  $\triangle OAB$  的面积最大值.

23. 已知函数  $f(x) = |x+1|$ .

- (1) 求不等式  $f(x) < |2x+1| - 1$  的解集  $M$ .
- (2) 设  $a, b \in M$ , 证明:  $f(ab) > f(a) - f(-b)$ .